



Agence Nationale de l'aviation Civile et de la Météorologie

Bulletin de la prévision saisonnière pour la période de Juillet–Août–Septembre 2026 (JAS 2026)

Direction Technique de la Météorologie



Service Climatologie, Environnement et Observation



PREVISION SAISONNIERE DES PLUIES ET DES TEMPERATURES JUILLET - AOÛT – SEPTEMBRE 2026

Contexte climatique

Pendant la saison de Juillet – Août – Septembre (JAS), le bassin Sud - Ouest de l'Océan Indien est en configuration hivernale. Durant cette période les Comores seront principalement sous l'influence des alizés du secteur Sud Est (**Kussi**) provenant du système des hautes pressions subtropicales de l'hémisphère sud. Par conséquent les îles connaissent généralement des températures plus basses (23 à 24°C), de l'humidité plus faible et des pluies réduites sur l'ensemble du territoire.

Comme d'autres petites Etats insulaires, les Comores sont vulnérables aux aléas climatiques notamment les inondations, les cyclones tropicaux, les vagues de chaleurs (etc). Face à ces menaces, la mise en place de politiques d'atténuation et d'adaptation efficaces, coordonnées et mise en œuvre au moment opportun devient impérative.

La diffusion régulière et fiable d'informations climatiques, notamment à l'échelle saisonnière, constitue un levier stratégique pour réduire la vulnérabilité des populations et renforcer la résilience des secteurs socio-économiques. En particulier, les secteurs sensibles au climat comme l'agriculture, la pêche, la santé, le tourisme, la gestion de l'eau et la gestion des risques de catastrophes doivent pouvoir accéder à ces informations, les comprendre et les utiliser pour mieux anticiper et s'adapter aux impacts du changement climatique.

Les prévisions saisonnières sont établies à partir d'une descente d'échelle appliquée à des modèles statistiques et climatiques reconnus par l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les résultats sont exprimés sous formes des terciles « **inférieurs à la normale, proches de la normale ou supérieurs à la normale** ». La normale climatique actuellement fixée par l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) est de la période de **1991-2020**.

Le présent bulletin climatique saisonnier comporte :

- Analyse des indices Climatiques ENSO (RONI), DOI, SDIO
- Evaluation de la saison Mars – Avril - Mai (MAM) 2026.
- La prévision des pluies et des températures pour la saison de Juillet – Août – Septembre (JAS) 2026.



1. a) Les indices climatiques pour la saison MAM (ENSO, DOI, SDOI)

Situation of SST std anomaly for the quarter MAM 2026 (ERA5)




Figure 01 : Evolution des indices climatiques jusqu'à la saison MAM

Evolution récente des indices climatiques pour MAM 2026:

- ENSO (RONI) est de retour en phase neutre avec une tendance positive ;
- IOD reste en neutre avec une tendance négative ;
- SIOD est en phase positive.



1. b) Les indices climatiques prévus pour la saison JAS (ENSO, DOI, SDOI)

Forecast of SST std. anomaly for JAS 2026 (ECMWF – MF – NCEP)





Figure 02 : Prédiction des indices climatiques pour la saison JAS 2026(ENSO, IOD, SIOD)

Climate indices multi-model forecast based on june 2026




Situation prévue au mois de Juin pour le trimestre JAS 2026 :

- ENSO(RONI) devrait rester en phase positive avec une tendance confirmée par les 3 modèles;
 - IOD devrait être neutre à positive;
 - SIOD devrait rester en phase neutre pour tous les modèles (NCEP, CEP51&MF9).
- Les modèles climatiques globaux ont prévu des anomalies positives pour la température de la surface de la mer (TSM) au niveau du pacifique (ENSO) et légèrement positive au niveau de l'océan Indien (Dipôle de l'Océan Indien).



2) Evaluation de la saison Mars - Avril –Mai 2026

Prévision saisonnière du mois de février pour la saison MAM 2026



Evaluation de la prévision de la saison MAM 2026


	Moyenne référence (1993-2016)	MAM 2026 Observée mm	Prévision MAM 2026 Faite au mois de février 2026
Moroni	700-800 mm	361.2	Normal à supérieure à la normale
Hahaya	400-500 mm	500.2	Normal à supérieure à la normale
Ouani	400-500 mm	325.9	Climatologique
Bandar-es-salam	300-400 mm	337.1	Proche de la normale

En comparaison avec les moyennes saisonnières de référence (1993-2016, figure à droite), les précipitations enregistrées au cours de la saison MAM 2026 montent que:


- Les observations et les prévisions sont similaires pour Hahaya et Banda-es-salam ;
- Elles ne sont pas conformes aux prévisions pour Moroni et Ouani (avec des valeurs inférieures à la moyenne),



3) Prévision saisonnière de la pluie pour la saison Juillet – Août - Septembre 2026



Les modèles climatiques globaux ont montré que la saison Juillet- Août – Septembre (JAS) 2026 devait être moins sèche que d'habitude avec des incertitudes.




Les moyennes pour la saison JAS ont indiquées que :

- les stations de Hahaya, Ouani et Bandar – salam les pluies varient entre 0 et 100 mm ;
- Pour la station de Moroni, les pluies sont entre 100 et 200mm.



3) Prévision saisonnière de la température pour la saison Juillet - Août – Septembre 2026



Les températures moyennes saisonnière (1993 à 2016) se situent au environ de 24 °C. La prévision saisonnière issue des modèles climatiques a montré que la saison Juillet – Août - Septembre 2026 devrait être supérieure à la moyenne.

Prochain bulletin sera émis au plus tard le 10 / 08 / 2026.

